

FERTIMICRO Mg

FORNECIMENTO DE MAGNÉSIO E MICRONUTRIENTES



Óxido de Magnésio (MgO) complexado com AG	4% p/p (5,5% p/v)
Boro (B) solúvel em água	0,2% p/p (0,3% p/v)
Cobre (Cu) complexado com AG	0,2% p/p (0,3% p/v)
Ferro (Fe) complexado com AG	2,7% p/p (3,7% p/v)
Manganésio (Mn) complexado com AG	1,6% p/p (2,2% p/v)
Molibdénio (Mo) solúvel em água	0,05% p/p (0,07% p/v)
Zinco (Zn) complexado com AG	0,35% p/p (0,5% p/v)
Densidade	1.4 g/cc
pH	3,5
Intervalo de estabilidade do quelato	pH 2-9

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, pode haver variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

DESCRIÇÃO

FERTIMICRO-Mg é um fertilizante solúvel de magnésio e microelementos (B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn) complexados com ácido glucónico para assegurar uma fertilização rápida e eficaz.

FERTIMICRO-Mg é essencial para manter uma alta atividade fotossintética: Mg participa na formação de ATP, na fixação de CO₂, na síntese de proteínas, na formação de clorofila, no transporte do floema, na divisão e uso de foto-assimilados e foto-oxidação das folhas.

FERTIMICRO-Mg é essencial para maximizar o transporte de carboidratos dos órgãos de origem para os órgãos de afundamento e alcançar altos rendimentos.

Aplicar **FERTIMICRO-Mg** a nível foliar em fases tardias para minimizar a produção de substâncias fototóxicas. Aplicar de forma curativa antes do aparecimento da clorose internerval típica devido à falta de Mg em folhas velhas, mais comum em altas intensidades de luz e limitações hídricas. **FERTIMICRO-Mg** também pode ser aplicado de maneira preventiva, especialmente em solos desgastados, arenosos e sujeitos a lavagens.

Aplicar via foliar ou fertirrigação em solos com pH ácido para facilitar a libertação de ácidos orgânicos pelas raízes que neutralizam os efeitos tóxicos do alumínio.

DOSE

Cultura	D. Foliar cc/ L	D. Radic. L/ha	Modo e época da aplicação
Citrosos	2-2,5	1-2	2-3 aplicações na primavera e no verão
Hortícolas	2-3	2-2,5	2-4 aplicações cada 15 dias a partir de duas semanas após o transplante
Parreiral e videira	1,5-2	1-1,5	2-3 aplicações da germinação ao amadurecimento
Oliveira	1,5-2	1-1,5	2-3 aplicações entre a germinação e o amadurecimento
Tropicais	2-3	2-4	Na primavera e no início do outono
Ornamentais viveiros ^e	1,5-2	1.2	Efetuar 2-3 aplicações ao longo do ciclo
Árvores de fruto de caroço e sementes	1,5-2	1-1,5	2 a 3 aplicações na primavera e no verão
Ornamentais	1-1,2	1-2	De preferência via solo, durante o ciclo de cultura.
Tropicais	1,5-2	2-4	Aplicar no final do inverno e do verão.

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.

arvensis agro S.A.

Carretera de Castellón Km 226,9 - 50720 La Cartuja - Zaragoza (ESPAÑA)

Tel: +34 976 169 181 · Fax: +34 976 169 183 · info@arvensis.com · www.arvensis.com

