

FERTIMIX - Zn

CONTRIBUIÇÃO DE ZINCO COMPLEXADO COM ÁCIDOS ORGÂNICOS



Zinco (Zn) complexado com AG	7,5 % p/p (10,6 % p/v)
Densidade	1.42 g/cc
pH	2,5
Agentes complexantes	AG
Intervalo de estabilidade da fração complexada:	pH 2-10

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

DESCRIÇÃO

FERTIMIX-Zn é um fertilizante líquido que fornece Zinco (Zn) complexado com ácido glucónico. É recomendado para aplicações foliares e via solo e para o tratamento de sementes. **FERTIMIX-Zn** é rapidamente assimilado por todos os órgãos, tanto pelas folhas como pela raiz da planta. É estável em qualquer tipo de solo (intervalo de pH 2-10).

Zn é um microelemento muito importante. A sua deficiência pode reduzir o rendimento das culturas em 20% sem apresentar sintomas.

FERTIMIX-Zn assegura um poderoso crescimento inicial de raízes, flores e folhas, evitando raquitismo e assegurando uma correta formação e desenvolvimento do sistema radicular e aéreo, principalmente dos frutos.

FERTIMIX-Zn aumenta a tolerância das plantas a fatores de stress ambiental como a elevada intensidade luminosa e a seca. **FERTIMIX-Zn** fornece o Zn necessário para que as plantas utilizem toda a energia luminosa absorvida durante o processo de fotossíntese.

FERTIMIX-Zn garante a disponibilidade contínua de Zn na zona da raiz. As carências de Zn causam a permeabilidade das membranas radiculares, perdendo açúcares e aminoácidos. Esta exsudação das raízes para o solo, além de desnutrir a planta, alimenta os patógenos. Por esta razão, **FERTIMIX-Zn** permite controlar a exsudação destes compostos, reduzindo consequentemente a infeção radicular por patógenos de maneira drástica.

FERTIMIX-Zn é especialmente recomendado em solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica e pH >7,4. As culturas que requerem Zn (milho, sorgo ou citrinos, etc.).

DOSE

Cultura	Dose foliar (cc/L)	Dose solo (L/ha)	Modo de aplicação
Citrinos	2-3,5	4-5	3 aplicações desde a germinação ao amadurecimento
Hortícolas	1,5-2	3-4	2-3 aplicações desde o início do crescimento
Berries	1,5-2,5	4-5	2-3 aplicações a partir da germinação
Tropicais	2-2,5	4-5	Aplicar no início da Primavera e durante o Verão
Cereais	1,5-2,5	3-4	Tratar quando a cultura tiver entre 4 e 8 folhas
Árvores de fruto	2-3	3-4	2 tratamentos na germinação e na primavera
Industriais	2-2,5	3-4	2-3 aplicações a partir de 2-4 folhas

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.

arvensis agro S.A.

Carretera de Castellón Km 226,9 - 50720 La Cartuja - Zaragoza (ESPAÑA)

Tel: +34 976 169 181 · Fax: +34 976 169 183 · info@arvensis.com

