

GELYFLOW - CaB

SUSPENSÃO CONCENTRADA DE CÁLCIO E BORO

Cálcio (Ca) Total	14,9% p/p (21,6% p/v)
Boro (B) total	3,8% p/p (5,51% p/v)
Densidade	1.45 g/cc
pH	8-9

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

DESCRIÇÃO

GELYFLOW-CaB é uma suspensão concentrada de cálcio (Ca) e boro (B) que fornece uma grande quantidade destes nutrientes com volumes muito pequenos, poupando no transporte e manuseio de recipientes ou embalagens. É especialmente recomendado quando se utilizam pequenos volumes de caldo. **GELYFLOW-CaB** pode ser aplicado via foliar e no solo.

GELYFLOW-CaB fornece conjuntamente cálcio (Ca) e boro (B) devido à relação e sinergia entre estes nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento dos botões apicais e ápices da raiz. Sem estes nutrientes, o crescimento de novos rebentos e novas raízes é paralisado. Ambos têm funções muito definidas e comuns: síntese da parede celular e integridade da membrana plasmática.

O **GELYFLOW-CaB** é altamente recomendado em áreas com temperaturas elevadas, humidade relativa baixa ou muito elevada e alta intensidade luminosa para evitar o bitter-pit ou formações suberosas, necrose apical e foliar e fissuração do fruto. O **GELYFLOW-CaB** também é recomendado em áreas onde as baixas temperaturas e a baixa luminosidade podem interferir nos processos de polinização, resultando em frutos deformados e/ou ocos.

GELYFLOW-CaB possui uma série de adjuvantes que lhe conferem excelentes propriedades de molhabilidade durante a sua utilização. A alta concentração de Ca e B proporcionada pelo **GELYFLOW-CaB** contribui para uma elevada absorção foliar por efeito de difusão passiva.

DOSE

Cultura	Dose foliar (cc/L)	Dose solo (L/ha e aplicação)	Modo de aplicação
Citrinos, árvores de fruto	1-1,5	2-4	1-2 Aplicações em fluxos de crescimento de primavera e outono.
Hortícolas	2-3	2-4	Aplicar 1 semana após 100% de emergência e repetir cada 10-15 dias até 2-3 aplicações.
Vinha e videira	6-9	2-4	Aplicar quando as gemas são visíveis; repetir na fase de engrossamento das gemas e na frutificação.
Tropicais	1-2	2-4	Efetuar 1-2 aplicações na fase de Pré-frutificação
Industriais	1,5-2,5	2-4	Aplicar nos primeiros sintomas de falta de Mn.
Cereais, café	3-6	2-4	Aplicar quando a cultura tiver entre 8 a 10 folhas visível até ao primeiro nó.
Oliveira	5-8	2-4	Aplicar na fase de germinação.

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.

arvensis agro S.A.

Carretera de Castellón Km 226,9 - 50720 La Cartuja - Zaragoza (ESPAÑA)

Tel: +34 976 169 181 · Fax: +34 976 169 183 · info@arvensis.com

