

GELYFLOW - Ca



SUSPENSÃO CONCENTRADA DE CÁLCIO

Óxido de cálcio (CaO) total 35 % p/p
(57,7% p/v)
Densidade 1.65 g/cc
pH 8-9

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

Utilização na agricultura biológica aprovada pela CAAE ao abrigo do requerimento RCE

DESCRIÇÃO

GELYFLOW-Ca é uma suspensão concentrada que fornece uma grande quantidade de cálcio com volumes muito pequenos, poupando no transporte e manuseio de recipientes ou embalagens. É especialmente recomendado quando se utilizam pequenos volumes de caldo. **GELYFLOW-Ca** pode ser aplicado via foliar e no solo.

GELYFLOW-Ca é um excelente protetor solar para folhas e frutos. Pulverizado na cultura, seca formando um filme com milhões de "prismas" microscópicos que atuam como espelhos refletindo a radiação ultravioleta e infravermelha nociva, sem impedir a fotossíntese. As propriedades refletoras de **GELYFLOW-Ca** protegem os frutos dos danos provocados pela exposição solar e ajudam a prevenir o stress do calor em todas as folhagens das culturas.

GELYFLOW-Ca é recomendado em solos ácidos (pH < 6,5) nos quais o Ca presente está pouco disponível para as plantas. **GELYFLOW-Ca** também é recomendado em condições áridas e/ou secas devido à má absorção de Ca pelas raízes através do encerramento dos estomas.

Evite misturar diretamente com ácidos fortes, assim como com produtos emulsionáveis e produtos de reação alcalina. Devem ser efetuados testes de compatibilidade antes da preparação de uma mistura final. Em caso de dúvida, consulte o Departamento Técnico.

DOSE

Cultura	Dose foliar (L/ha)	Dose solo (L/ha)	Modo de aplicação
Citrinos e árvores de fruto	2 - 2,5	3 - 3,5	Efetuar 3 ou 4 aplicações cada 15 dias a partir do vingamento dos frutos
Hortícolas	2 - 2,5	3 - 3,5	Efetuar várias aplicações cada 15 dias, conforme necessário.
Morangos e framboesa	2 - 2,5	3 - 3,5	Efetuar várias aplicações cada 15 dias, conforme necessário.
Abacateiro e bananeira	2 - 2,5	3 - 3,5	Efetuar 2 aplicações no final do inverno
Industriais	2 - 2,5	3 - 3,5	2 a -3 aplicações a partir de que a cultura cubra o solo

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.

