

LECISFUN

Substância básica fungicida à base de lecitina

Lecitina	100 %
Densidade	1,0 g/cc
pH	6,5



Producto aprobado para uso em produção biológica segundo o Reg. 834/2007 e NOP pelo CAAE".

DESCRIÇÃO

LECISFUN é um produto concentrado emulsionável baseado em lecitina aprovado como substância fungicida básica pelo Regulamento (CE) nº 1107/2009 (CAS nº 8002-43-5). Produto de aplicação foliar, sendo a sua dose de aplicação geral de 200-300 cc por 100 litros de água, com um volume de água recomendado por hectare de 300 L em plantas ornamentais, vinha e batata, 500-1000L em fruteiras e 1000-1500L em horticultura. O produto não deve ser aplicado com altas temperaturas. Aplicar 2 a 6 vezes com intervalos de 7 dias. Antes de preparar uma mistura final, é aconselhável realizar alguns testes de compatibilidade.

DOSE

Grupo	Dose Foliar	Modo e época de aplicação
Fruteiras	200-300	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>) em maçã e lepra (<i>Taphrina deformans</i>) do pessegueiro
Vinha	200-300	Plasmopara vitícola e Erysiphe necátor
Tomate e batata	200-300	<i>Phytophthora infestans</i>
Endívia	200-300	<i>Alternaria cichorii</i>
Groselha	200-300	<i>Microsphaera grossulariae</i>
Alface	200-300	<i>Erysiphe cichoracearum</i>
Hortícolas	200-300	Controlo de míldio e oídio
Ornamentais	200-300	Míldio e outras doenças fúngicas
Pepino	200-300	<i>Microsphaera grossulariae</i>
Canónicos	200-300	<i>Erysiphe polyphaga</i>
Pequenos frutos	200-300	<i>Podosphaera aphanis</i> e <i>Phytophthora fragariae</i>
Cenoura	200-300	<i>Leveillula taurica</i>

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consultar o Departamento Técnico de Arvensis.

O intervalo de segurança é de 5 dias exceto em vinha, que é de 30. Em pequenos frutos e batata não existe.

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela inobservância das instruções do rótulo.



Carretera Castellón km 2269 Polígono Prides
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181