

QUICELUM



A MISTURA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES DE ORIGEM MINERAL MELHORA A FLORAÇÃO, O VINGAMENTO E ENGROSSAMENTO DOS FRUTOS

Boro (B) solúvel em água	0,2% p/p (0,24% p/v)
Cobre (Cu) solúvel em água	0,5% p/p (0,6% p/v)
Ferro (Fe) solúvel em água	2% p/p (2,4% p/v)
Manganésio (Mn) solúvel em água	0,5% p/p (0,6% p/v)
Molibdénio (Mo) solúvel em água	0,02% p/p (0,024% p/v)
Zinco (Zn) solúvel em água	0,5% p/p (0,6% p/v)

Densidade 1.2 g/cc

pH 8,9

ADUBO CE

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

Certificado emitido pelo BCS ÖKO em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 889/2008 (UE) e USDA/NOP-Final rule (EUA) 205.203(c)(3), 205.601(j) e JAS No. 1605 (Japão), para utilização na agricultura biológica como fertilizante

DESCRIÇÃO

QUICELUM é um produto de origem vegetal, totalmente orgânica, com 0% de resíduos, com uma fórmula equilibrada de micronutrientes minerais. **QUICELUM** aumenta a divisão celular, induz ao vingamento e aumenta o teor de açúcar. Além disso, aumenta o número de frutos, o seu tamanho e respetiva consistência.

QUICELUM é compatível com fertilizantes N-P-K e produtos fitossanitários. Evitar misturas diretas com ácidos fortes como: sulfúrico, nítrico, fosfórico; e com bases fortes. O pH ideal para o tratamento é de 7-8. Devem ser efectuados ensaios de compatibilidade antes da preparação de uma mistura final. Em caso de dúvida, consultar o Departamento Técnico.

DOSE

Grupo	Dose Foliar cc/L	Modo e época da aplicação
Plantas aromáticas	0,5-0,75	Aplicar dois a três tratamentos durante o período de crescimento.
Cereais	0,75-1	Aplicar juntamente com o herbicida pós-emergência.
Citrinos Silvicultura Árvores de fruto	0,75-1	Realizar 3 aplicações: 1ª na pré-floração: garante uma melhor floração e vingamento 2ª Após o vingamento: diminui a queda dos frutos e promove o seu engrossamento. 3ª No engrossamento: Aumenta o peso e a cor dos frutos; qualidade e uniformidade.
Hortícolas	0,75-1	Aplicar antes da pré-floração e continuar cada 20 dias.
Industriais	0,5-0,75	Aplicar quando 2-4 folhas estiverem visíveis; repetir após 20 dias.
Ornamentais	0,5-0,75	Aplicar dois a três tratamentos durante o período de crescimento.
Tropicais	0,75-1	Efetuar duas aplicações, desde o final do inverno ou no final do verão.

*Para OUTRAS CULTURAS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.



Carretera Castellón km 226,9 Polígono Prdes
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181